



Международный Образовательный Эндоскопический видео Форум

1 ноября 2018г.
г. Москва

Шишин Кирилл Вячеславович

**д.м.н., заведующий отделением
оперативной эндоскопии
ГБУЗ Московский клинический научный
центр ДЗМ**

Москва

IEEF 2018

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
ДИВЕРТИКУЛА ЦЕНКЕРА



Показания к оперативному лечению

наличие клинических проявлений
заболевания



Противопоказания к оперативному лечению

- Декомпенсированные формы хронических заболеваний
- Дивертикулит (без попыток придварительного консервативного лечения)
- Подозрение на опухолевое поражение

Предоперационное обследование

- Клиническая диагностика
- Рентгенологическое исследование
- Эндоскопическое исследование
 - ✓ Предпочтительно трансназальная эндоскопия
 - ✓ Предпочтительно под местной анестезией



Предоперационное обследование

- Компьютерная томография (в редких случаях осложненного течения и непонятной клинической картине заболевания)
- Эндосонография не показана !!!



Цель оперативного лечения

- Редукция полости дивертикула
 - Дивертикулотомия
- Восстановление пассажа пищи
 - Формирование широкого соустья
- Профилактика рецидива заболевания
 - Полная крикофарингомиотомия

Стандартная эндоскопическая крикофарингомия



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Недостатки/ошибки стандартной эндоскопической крикофарингомиеотомии

- Неполное рассечение общей стенки
- Невозможность выполнения продольной миотомии ниже дна дивертикула

Видео 4



Видео 5



Эндоскопическая эзофагокрикофаринго- миотомия по тоннельной методике



Видео 6



Видео 7



Видео 8



Рентгенологическое исследование



Видео 9



Недостатки эндоскопической эзофагокрикофаринго- миотомии по тоннельной методике

- Наличие остаточной полости дивертикула
- Потенциальный риск рецидива при большом дивертикуле



Эндоскопическая эзофагокрикофаринго- миотомия по комбинированной методике



Видео 10



Видео 11



Рентгенологическое исследование



Видео 12



Заключение (1)

Стандартами успешного эндоскопического лечения дивертикула Ценкера являются:

- ✓ Отчетливая визуализация пересекаемых мышечных структур
- ✓ Стандартизированный объем миотомии, включая верхнепищеводную миотомию вне зависимости от размеров дивертикула



Заключение (2)

Стандартами успешного эндоскопического лечения дивертикула Ценкера являются:

- ✓ Полноценное закрытие слизистой с профилактикой возможного затека и медиастинита

